BULLETIN FOURRAGES

2 juin 2023 – n°3

Des récoltes perturbées par les pluies

Données météo

Données Météo France

Données du 28-mai	Précipitations du 22-mai au 28-mai	Précipitations 30 derniers jours	Cumuls températures depuis le 01/02* 2023	écart par rapport à 2022	Cumuls de températures repères pour la fauche: Foin de qualité prairies précoces[1] (fin épiaison) 1100 °j	Foin fibreux prairies précoces[1] (floraison) 1200 °j	Foin de qualité prairies tardives (fin épiaison) 1500 °j
Auch	15 mm	88 mm	1283 °j	+6 jours	16-mai	20-mai	9-juin
Condom	51 mm	118 mm	1345 °j	+4 jours	12-mai	15-mai	5-juin
Fleurance	9 mm	54 mm	1327 °j	+6 jours	13-mai	17-mai	6-juin
Gimont	15 mm	67 mm	1313 °j	+5 jours	14-mai	18-mai	7-juin
Lahas	41 mm	102 mm	1326 °j	+3 jours	12-mai	16-mai	6-juin
Lannepax	20 mm	107 mm	1326 °j	+4 jours	13-mai	17-mai	6-juin
Le Houga	22 mm	109 mm	1336 °j	+3 jours	12-mai	16-mai	6-juin
Mauroux	5 mm	53 mm	1346 °j	+5 jours	12-mai	15-mai	5-juin
Mirande	22 mm	103 mm	1308 °j	+5 jours	14-mai	18-mai	7-juin
Maumusson	35 mm	101 mm	1358 °j	+3 jours	11-mai	14-mai	4-juin
Peyrusse-Grande	61 mm	153 mm	1334 °j	+2 jours	12-mai	16-mai	6-juin
Sadeillan	24 mm	128 mm	1316 °j	+2 jours	13-mai	17-mai	7-juin
Parlebosq	34 mm	127 mm	1320 °j	+5 jours	14-mai	17-mai	7-juin
Castelnau-Magnoac	39 mm	137 mm	1257 °j	+2 jours	17-mai	21-mai	10-juin
Vic-en-Bigorre	54 mm	140 mm	1270 °j	+4 jours	17-mai	20-mai	10-juin

*cumul des températures moyennes journalières depuis le 1er février. Prévisions : à partir des prévisions pour les 14 prochains jours puis des valeurs moyennes sur 20 ans

- Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride, ray-grass anglais précoce à ½ précoce…
- Prairies tardives : prairies naturelles à base d'agrostis, fléole, chiendent rampant… prairies semées à base de ray-grass anglais tardif, fléole

Prévisions : encore pluvieux et orageux

3 mm 1-2 mm 9 mm 3 mm 9-10 mm

Prévisions Météo France pour Auch au 02/06 (pluies : Météociel)

Chambre d'Agriculture du Gers – 3, chemin de la Caillaouère – CS 70161 32003 Auch cedex
Tél. : 05 62 61 77 54 - Contact : François RATIER
OPE.COS.ENR.40.13.03.17

Conseils de saison :

Récoltes des foins en conditions météo incertaines

Avec une météo perturbée par de fréquents orages, la récolte des foins est compliquée. **Quelques conseils pour des récoltes de foin en conditions « limites » de teneur en humidité :**

- **Faucher plus haut** (7-8 cm) pour faciliter la circulation de l'air sous les andains et les isoler du sol humide.
- **Limiter le diamètre des balles** si le foin risque d'être pressé pas tout à fait sec : plus le volume de la balle est faible, plus il y a de surface en contact avec l'extérieur par kilo de foin, ce qui rend plus facile l'évacuation de la chaleur et de l'humidité
- **Faire des balles moins serrées**, moins denses : le séchage sera facilité par une meilleure circulation de l'air. A l'inverse, des balles plus serrées c'est plus de matière dans la balle et donc plus de « carburant » pour le processus d'échauffement.
- **Attention** : pour e**nrubanner un fourrage déjà très sec** mais pas assez pour une bonne conservation en foin parce que la pluie arrive plus tôt que prévu, **les critères à respecter pour le pressage sont inversés** par rapport à ceux conseillés pour un foin. Pour une bonne conservation en enrubannage, il faut le moins d'air possible dans la balle. Il faut donc réaliser des **balles très serrées** pour réduire au maximum la présence d'air dans la balle, et de **plus gros diamètre**, pour avoir le moins de surface en contact avec l'extérieur par rapport à la quantité de fourrage.

- En cas de doute sur la teneur en humidité au pressage, **laisser les balles à l'extérieur** (2 à 3 semaines), et ne les rentrer qu'après avoir **contrôlé** leur **température** à l'aide d'une sonde (coût autour de 100-150 €). Un fabricant propose une sonde « connectée » permettant le suivi en continu de la température et l'envoi d'alertes par SMS ou e-mail (coût autour de 470 €).
- Si des balles douteuses sont rentrées à l'abri, ne pas les empiler ou au moins éviter de trop les serrer pour que l'air circule, assurer une ventilation maximale du bâtiment et suivre régulièrement leur température.

Pour plus de précisions, vous pouvez télécharger sur notre site internet une **note technique sur les foins récoltés en conditions humides**.

Pâturage : s'adapter aux conditions humides

- Les **fortes pluies** de ces derniers jours ont pu dégrader la portance des pâtures : **quelques pistes pour limiter les dégâts**
  - en pâturage tournant (temps de séjours par parcelle de moins de 4-5 jours), réduire le temps de séjour (tourner plus vite). Sinon, augmenter la surface accessible.
  - sortir les animaux que quelques heures dans la journée permet de limiter le piétinement : ils passent alors une plus grande partie de leur temps à brouter pour maximiser leur ingestion d'herbe, et se déplacent moins. C'est ce qui a été mesuré dans plusieurs essais réalisés par l'INRAe avec des vaches ou des chèvres laitières.
  - sacrifier une parcelle ou partie de parcelle en y parquant les animaux, notamment les plus lourds, et en affourrageant en complément.

- Vous pouvez **profiter des pluies pour ébouser** : cela permet une repousse plus homogène (meilleure répartition des éléments minéraux) et moins de refus.