BULLETIN FOURRAGES

Note technique - juin 2017

➢ Gestion du pâturage en été : préserver les prairies

En période de pousse ralentie voire nulle, il est nécessaire d'adapter la conduite du pâturage pour éviter la dégradation des prairies et pouvoir profiter au maximum des possibilités de repousse permises par les pluies éventuelles.

Pour cela il faut respecter au maximum 3 points :

- **éviter de pâturer trop ras** : il doit rester environ **7 cm d'herbe** (au talon) quand les animaux sortent de la parcelle. La présence de feuilles vertes facilite le redémarrage de la croissance (les plantes puisent moins dans leurs réserves) et un couvert un peu plus haut limite l'évaporation de l'eau du sol. Ainsi les parcelles de pâture seront sauvegardées et pourront repartir rapidement après la pluie. De même, une **fauche pas trop rase pour les regains** permettra une repousse plus rapide : ne pas descendre en dessous de **6-7 cm, 8 cm en présence de luzerne**.

- **laisser l'herbe repousser suffisamment** avant de faire repâturer la parcelle : attendre qu'il y ait environ **15 cm** d'herbe (à la cheville), et au minimum 12 cm. La croissance étant moins rapide qu'en pleine pousse printanière, le temps de **repousse** des parcelles doit être plus élevé : souvent **5 à 7 semaines**. Il est donc nécessaire de diminuer le chargement : alors que 25 à 50 ares / UGB suffisent généralement au printemps, il faut en prévoir 2 fois plus pour l'été et l'automne, le plus souvent **50 à 80 ares /UGB**. Cette diminution de chargement peut être obtenue soit **en réduisant le nombre d'animaux**, soit **en augmentant la surface pâturée** avec des repousses de parcelles fauchées ou des cultures dérobées estivales (moha, millet, sorgho fourrager : voir fiche technique téléchargeable sur notre site : www.gers.chambre-agrulture.fr, rubrique *Fourrages*).

- **Limiter le temps de séjour sur chaque parc** : idéalement **7-8 jours maximum**. Plus le temps de séjour sur la même parcelle est long, plus les animaux ont la possibilité de rebrouter les jeunes repousses des plantes qu'ils ont consommées en début de séjour. Celles-ci sont souvent les plus appétentes et les plus intéressantes par leur aptitude à pousser en conditions chaudes et sèches. Ce surpâturage va épuiser les réserves de ces espèces qui vont finir par disparaitre.

Pour atteindre ces objectifs de temps de séjour maximum de 7-8 jours et de temps de repousse de 5-7 semaines, il faut organiser un **pâturage tournant sur environ 7 parcs**.

Si le chargement ne peut pas être suffisamment réduit par manque de surfaces accessibles, ou **en cas d'arrêt complet de pousse de l'herbe** sur une longue période, il vaut mieux **affourager quelques temps sur une surface limitée** sans laisser les animaux accéder à toutes les parcelles. La parcelle d'affourragement sera probablement très dégradée et bonne à resemer, mais les autres surfaces seront préservées et capables de repousser rapidement au retour de la pluie.