# 0-Herbi-Viti

Résultats Côtes de Gascogne

***Analyser la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la suppression des herbicides en viticulture, notamment par le biais de l'enherbement sous le rang***

# Objectifs de l'étude

**- Contextualiser la problématique de l'utilisation des herbicides en viticulture.**

**- Etablir un état des lieux pour chacun des bassins étudiés (Cahors, Madiran, Côtes de Gascogne, Haut-Médoc et Bordeaux-Engranne).**

**- Déterminer les éléments de motivation et les freins à la pratique de l'enherbement sur chacun des bassins.**

# Echantillonnage

**Enquêtes auprès de plus de 300 viticulteurs au total sur les 5 bassins dont 87 en Côtes de Gascogne**

**Données relevées sur 4 thématiques : exploitation, exploitant, matériel végétal et pratique culturale**

**Plus de 20 % de la population mère a été échantillonnée (exploitations > 4 ha)**

**Limites :**

- **Disponibilité des professionnels**
- **Volumes d'échantillonnage**

# Résultats des statistiques descriptives

# Des exploitations peu spécialisées

- 50% d'indépendants et 50% de coopérateurs
- Vignoble essentiellement en IGP en production de vins blancs
- 58% des surfaces viticoles sont entre 10 et 30 ha
  35% plus de 30 ha
  7% moins de 10 hectares
- La majorité des exploitations sont en polyculture
- Moyenne des surfaces en vigne 33 ha, la médiane 25 ha.

# Le matériel végétal (suite)







**50 % des exploitations interrogées densité > 3700 pieds**
**Rendement moyen et médian en 2009 : 86 hl/ha**

# Les pratiques culturales




**Pratiquement l'ensemble des exploitations utilise des herbicides**

# Les pratiques culturales (suite)




- **82%** traitent uniquement la zone **sous le rang** des vignes,
- **Seulement 2 exploitations** ne pratiquent **aucune intervention chimique**, elles **pratiquent** donc **d'ores et déjà des alternatives à une intervention chimique**.

# Les pratiques culturales (suite)

## Stratégies de désherbage :

- **57 % des viticulteurs un herbicide de post-levée au printemps et puis un second en été,**

- **26 % des viticulteurs deux herbicides au printemps (un post-levé et un pré-levée) et un herbicide en été (post-levée),**

- **Et 11 % des viticulteurs un herbicide de pré-levée au printemps et un post-levée en été**

# Les pratiques culturales (suite)




**L'enherbement est présent sur 90% des exploitations et très majoritairement un rang sur deux**

# Les pratiques culturales (suite)




**L'enherbement est essentiellement naturel et pratiqué 1 rang sur 2.**
**L'espèce majoritairement semée est la fétuque rouge traçante**

# Les pratiques culturales (suite)




**Pratiquement 70% des exploitations ont recours à du travail du sol pour la population étudiée**

# Les pratiques culturales (suite)




**Position face à l'enherbement total :**

- **Plus de 70% des enquêtés ayant répondu à cette question se disent contre ou plutôt contre cette pratique,**
- **Moins de 20% se disent tout à fait favorable ou favorable à cette méthode d'entretien des sols**

# Bilan

- Si l'enherbement est bien présent dans le vignoble, son utilisation est limitée à un rang sur deux en très grande majorité
- Il y a aujourd'hui très peu d'utilisation d'alternatives au désherbage chimique sous le rang, donc une grande marge de progression…
- Mais une aspiration au développement de l'enherbement total très faible
- La présentation d'alternatives combinant travail du sol et enherbement semble plus pertinente.