

Bulletin fourrage

Ensilages et enrubannages toujours d'actualités !

Les trop courtes plages de beau temps ne permettent pas de faire du sec. Ensilage ou enrubanner sont les seuls moyens pour récolter des prairies temporaires de qualité.

Les pluies à répétition vont retarder le début des fauches : il serait judicieux d'attendre le ressuyage des sols de certaines parcelles et surtout le retour durable du soleil.

Si les animaux sont encore sur des premiers tours de pâturage, l'herbe durcit et on constate de nombreux refus. N'hésitez pas à débrayer certaines parcelles dont l'herbe est trop haute pour éviter le gaspillage. Un broyage des refus est également conseillé pour une repousse plus régulière.

Données Météo au 17 mai 2013	Somme de températures	Enrubannage	Fauche	Fauche
		Fauche précoce	1000° jour	1100° jour
AUCH	1050° jour	13 mai	20 mai	01 juin
CONDOM	1042° jour	14 mai	21 mai	02 juin
LAHAS	1133° jour	07 mai	14 mai	25 mai
LE HOUGA	1051° jour	13 mai	20 mai	01 juin
MAUROUX	1017° jour	16 mai	23 mai	04 juin
PEYRUSSE-GRANDE	1045° jour	14 mai	21 mai	02 juin
CASTELNAUMAGNOAC	1010° jour	16 mai	24 mai	05 juin
VIC BIGORRE	1055° jour	13 mai	20 mai	01 juin

REPERES D'INTERVENTIONS	Ensilage ou enrubannage	Foin de bonne valeur	Foin fibreux
Prairie temporaire précoce : RGI...	750° jour	850° jour	950° jour
Autres prairies temporaires	850° jour	950° jour	1100° jour
Prairie permanente fertile	1000° jour	1100° jour	1300° jour
Prairie permanente tardive	1100° jour	1200° jour	1400° jour

Contact : Maison de l'Élevage au 05.62.61.79.60

