

Des repères pour gérer l'herbe

Bien faire pâturer, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment concernant : le démarrage de la saison du pâturage ; l'entrée des animaux sur les parcelles ; la sortie des animaux de la prairie. Il existe différents outils de gestion plus ou moins perfectionnés dont un particulièrement pratique et facile d'accès : vos bottes ! Prenez l'habitude de parcourir régulièrement vos prairies et vous vous ferez rapidement vos repères.

A LA DATE DU 7 AVRIL	Somme des températures	Fin de déprimage Parcelles fertiles	Fin de déprimage Parcelles tardives
		500° jour	600° jour
AUCH	517°j	05 avril	15 avril
CONDOM	507°j	04 avril	16 avril
LAHAS	593°j	27 mars	08 avril
LE HOUGA	518°j	05 avril	15 avril
MAUROUX	494°j	08 avril	17 avril
PEYRUSSE GRANDE	516°j	05 avril	15 avril

Des mises à l'herbe perturbées

Les conditions météo humides de ce début de printemps ont contribué, dans la plupart des cas, à des sorties tardives des animaux.

Cette situation a souvent provoqué un retard sur les "tours d'herbe" qui risque de s'accroître de plus en plus, car les animaux entrent sur des pâtures où l'herbe est toujours plus haute.

Les temps de séjour sur chaque parcelle sont plus long que prévu et pour palier à cette situation, deux options peuvent être envisagées :

• **Réserver les parcelles les plus avancées pour la fauche.** Elles seront "sautées" lors du tour de pâ-

turage, fauchées précocement (enrubannage si nécessaire) puis réintégrées au circuit de pâturage lors des repousses. Le nombre de parcelles à sortir dépendra de la hauteur d'herbe des premières parcelles pâturées.

Les éleveurs ne souhaitant pas faucher de petites parcelles pour des raisons pratiques peuvent choisir une autre option,

• **Augmenter la pression de pâturage le temps de "rattraper" l'herbe.** En ajoutant des animaux au lot initial tant que l'herbe est trop abondante pour essayer de rattraper le retard.

• Anticiper votre mise à l'herbe



L'herbe arrive au niveau de la cheville

Si vous souhaitez recevoir le bulletin fourrages par mail, veuillez nous le confirmer à l'adresse suivante :

ede32@gers.chambagri.fr

C'est un moment crucial qui va conditionner toute votre saison de pâturage, la qualité de l'herbe prélevée par vos animaux et donc, leurs performances. La mise à l'herbe (c'est-à-dire l'entrée sur la première parcelle à faire pâturer de l'année) doit se faire de façon précoce, avant que l'herbe n'atteigne les 8 cm de hauteur. La rotation doit alors se faire très rapidement, il faut avoir l'im-

pression de "courir après l'herbe".

Si vous attendez d'avoir une hauteur "correcte" d'herbe sur la première parcelle, vous allez vous faire dépasser par la pousse. Dès lors, vous ferez pâturer une herbe trop haute qui sera mal valorisée par vos animaux. Il y aura des refus et donc, perte d'une partie de l'herbe produite !

• 10 cm d'herbe : faites entrer vos animaux

Une entrée optimum des animaux se fera à 10-12 cm d'herbe. Cette hauteur vous garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité.

Si vous mettez les animaux dans une parcelle avec une hauteur d'herbe plus élevée, l'herbe sera de moins bonne qualité et mal pâturée, créant ainsi des refus et la nécessité de les broyer.



Hauteur bas du mollet



Hauteur mi-mollet

• A 15 cm : réserver pour la fauche

Au-delà de 15 cm de hauteur, la parcelle devra être réservée à la fauche.


A cette hauteur, l'herbe sera de moindre qualité et très mal pâturée, créant ainsi des refus et l'obligation de les broyer.

• A 5 cm : il faut sortir de la parcelle

La sortie des animaux des parcelles se fera à une hauteur de 5 cm, quand l'herbe arrive au niveau du talon de la botte.

Si vous faites pâturer en-dessous de cette hauteur, la plante mettra plus de temps à repartir, car elle devra auparavant fabriquer des feuilles pour optimiser la photosynthèse.

Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du parasitisme.



Hauteur du talon

Contact : Maison de l'Elevage
au 05.62.61.79.60

